

布病

防控知识要知道

一、什么是布病？



布鲁氏菌简称布病，是由布鲁氏菌引起的牛、羊等动物和人类共患的传染病。



引起人布病的主要是羊种、牛种布鲁氏菌，患病牛羊为人布病的主要传染源。



家畜感染布病后出现流产、死胎、不孕、跛行或后肢麻痹以及睾丸炎等症状。



人感染布病后，出现发热、多汗、全身乏力、关节肿大和肌肉疼痛等症状，严重的可丧失劳动能力。

二、人是如何感染布病的？



人可以通过消化道、呼吸道、损伤的皮肤黏膜感染布病。



接触被污染的水、土壤、皮毛、饲料、粪便、尿液等。



直接接触病畜和流产胎儿、羊水等流产物、分泌物。



食用未经煮熟的生鲜奶和牛羊肉等。

三、养殖场怎样预防布病？



牛羊养殖场要严格定期消毒。



加强引种监管，引进健康动物，自繁自养，培育健康畜群。



定期开展布病监测，及时发现病畜。



按照国家规定免疫布病疫苗，保护易感家畜。

四、发生布病如何处置？



发现流产等疑似布病病畜或自验阳性畜，及时隔离相关动物，报告当地兽医部门。



当地兽医部门及时对疑似动物进行采样和诊断。



确诊后，对病畜进行扑杀和无害化处理，并对环境、器具进行消毒。



对同群畜进行隔离饲养，加大监测频率或全群淘汰。

五、如何做好个人防护？



应穿戴口罩、手套、工作服等后进入圈舍，严禁赤手接产，工作结束后及时清洗和消毒。



免疫和采样过程中采取双压尘双封闭措施，严禁工作过程中进食、喝水、抽烟。



开展防疫、扑杀、采样、无害化处理等工作时要做好生物安全防护，并对环境进行消毒。



从业人员要定期进行体检，发现患病及时到正规医院进行治疗。